

- Dr. Pierre BRU
 Dr. Yves CHIARA
 Dr. Etienne FOURQUET
 Dr. Patrick FROTTÉ
 Dr. Don-Pierre GIUDICELLI
 Dr. Manuel GRATIEN
 Dr. Franck LHUILLIER
 Dr. Pierre MAILLOT
 Dr. Stéphane PLATEAU
 Dr. Jean-Claude RICHE
 Dr. Philippe ROBERT
 Dr. Bernard VERNET

Consultation le _____ à _____

Nom : _____

Prénom : _____

Date de naissance : _____

QUESTIONNAIRE A REMETTRE LORS DE LA CONSULTATION

Madame, Monsieur,

Vous ou votre enfant allez bénéficier d'une intervention chirurgicale ou d'un examen sous anesthésie générale ou loco-régionale.

La consultation d'anesthésie pré-opératoire permet de vous connaître et d'adapter la technique d'anesthésie à votre cas. Elle a été rendue obligatoire par la loi du 5 Décembre 1994.

Pour voir en consultation l'anesthésiste qui s'occupera de vous pendant votre séjour, nous vous demandons de prendre rendez-vous **le plus tôt possible** au 04-72-19-34-33, de 8 H à 19 H 30 du Lundi au Vendredi.

Nous vous prions de **remplir ce questionnaire avec le plus grand soin**, et d'apporter vos examens récents (sanguins, cardiologiques, ou radiologiques), vos cartes de groupe sanguin et vos ordonnances récentes.

Poids : _____ Taille : _____

	OUI	NON
Avez-vous déjà eu une intervention chirurgicale ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laquelle ? _____		
<hr/>		
Vous a-t-on signalé un problème particulier ou une complication ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un de vos parents a-t-il présenté un accident d'anesthésie ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etes-vous allergique ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous de l'asthme ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous un rhume des foins, de l'urticaire, de l'eczéma ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous fait une réaction à un médicament ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lequel ? _____		
Avez-vous eu des problèmes de cœur :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un infarctus, de l'angine de poitrine ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Des palpitations ? Une pile ? Un entraînement électro-systolique ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faites-vous de l'hypertension artérielle ? De l'hypotension ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous des varices ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous fait une phlébite ou une embolie pulmonaire ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OUI NON

- Avez-vous eu une maladie pulmonaire sévère ou chronique ?**
- Avez-vous eu une maladie neurologique ?**
- Un coma, une paralysie, un accident cérébral ?
- Des crises d'épilepsie ?
- Une dépression nerveuse ?
- Des migraines ?
- Des problèmes de colonne vertébrale ?
- Votre enfant fait-il des cauchemars toutes les nuits ou presque ?
- Avez-vous eu des problèmes d'hémorragie ?**
- Saignez-vous longtemps après une blessure peu importante ?
- Saignez-vous souvent ou longtemps du nez ou des gencives ?
- Vous faites-vous des hématomes spontanément ?
- Y a-t-il des maladies de coagulation dans votre famille ?
- Avez-vous déjà été transfusé ?
- Avez-vous fait des coliques néphrétiques ?
- Avez-vous fait des pyélonéphrites ou infections urinaires graves ou fréquentes ?
- Avez-vous de l'albumine ou une insuffisance rénale ?
- Avez-vous des problèmes de prostate ? Vous levez-vous plusieurs fois par nuit ?
- Avez-vous un ulcère à l'estomac ou au duodénum , ou une hernie hiatale ?
- Avez-vous fait une hépatite, une jaunisse ?
- Avez-vous un diabète connu ?
- Avez-vous des problèmes de thyroïde ?
- Avez-vous des prothèses dentaires ou des dents sur pivots ?
- Avez-vous un glaucome ?
- Avez-vous des verres de contact, des lentilles cornéennes ?

Si vous fumez, combien : _____

Avez-vous été hospitalisé pour une autre affection ?

Laquelle ? _____

Avez-vous un traitement actuellement ?

Lequel ? _____

Avez-vous déjà eu un test du SIDA, une sérologie HIV ?

Avez-vous autre chose à signaler ?

Madame, avez-vous des enfants ? Combien : _____

Prenez-vous la pilule ?

Etes-vous enceinte ?

Date : _____

Signature :

Certains anesthésistes étant conventionnés en Secteur 2, les honoraires peuvent être plus élevés que le remboursement par la Sécurité Sociale, et dans ce cas éventuellement couverts par votre Mutuelle.

SOCIETE FRANCAISE D'ANESTHESIE ET DE REANIMATION

Information médicale sur l'anesthésie

Ce document est destiné à vous informer sur l'anesthésie, ses avantages et ses risques. Nous vous demandons de le lire attentivement, afin de pouvoir donner votre consentement à la procédure anesthésique qui vous sera proposée par le médecin anesthésiste-réanimateur. Vous pourrez également poser à ce médecin des questions sur cette procédure. Pour les questions relatives à l'acte qui motive l'anesthésie, il appartient au spécialiste qui réalisera cet acte d'y répondre.

QU'EST-CE QUE L'ANESTHÉSIE ?

L'anesthésie est un ensemble de techniques qui permet la réalisation d'un acte chirurgical, obstétrical ou médical (endoscopie, radiologie...), en supprimant ou en atténuant la douleur. Il existe deux grands types d'anesthésie : l'anesthésie générale et l'anesthésie locorégionale.

- L'anesthésie générale est un état comparable au sommeil, produit par l'injection de médicaments, par voie intraveineuse et/ou par la respiration de vapeurs anesthésiques, à l'aide d'un dispositif approprié.
- L'anesthésie locorégionale permet, par différentes techniques, de n'endormir que la partie de votre corps sur laquelle se déroulera l'opération. Son principe est de bloquer les nerfs de cette région, en injectant à leur proximité un produit anesthésique local. Une anesthésie générale peut être associée ou devenir nécessaire, notamment en cas d'insuffisance de l'anesthésie locorégionale.

La rachianesthésie et l'anesthésie péridurale sont deux formes particulières d'anesthésie locorégionale, où le produit anesthésique est injecté à proximité de la moelle épinière et des nerfs qui sortent de celle-ci.

Toute anesthésie, générale ou locorégionale, réalisée pour un acte non urgent, nécessite une consultation, plusieurs jours à l'avance et une visite préanesthésique, la veille ou quelques heures avant l'anesthésie selon les modalités d'hospitalisation. Comme l'anesthésie, elles sont effectuées par un médecin anesthésiste-réanimateur. Au cours de la consultation et de la visite, vous êtes invité(e) à poser les questions que vous jugerez utiles à votre information. Le choix du type d'anesthésie sera déterminé en fonction de l'acte prévu, de votre état de santé et du résultat des examens complémentaires éventuellement prescrits. Le choix final relève de la décision et de la responsabilité du médecin anesthésiste-réanimateur qui pratiquera l'anesthésie.

COMMENT SEREZ-VOUS SURVEILLÉ(E) PENDANT L'ANESTHÉSIE ET À VOTRE RÉVEIL ?

L'anesthésie, quel que soit son type, se déroule dans une salle équipée d'un matériel adéquat, adapté à votre cas et vérifié avant chaque utilisation. Tout ce qui est en contact avec votre corps est soit à usage unique, soit désinfecté ou stérilisé. En fin d'intervention, vous serez conduit(e) dans une salle de surveillance post-interventionnelle (salle de réveil) pour y être surveillé(e) de manière continue avant de regagner votre chambre ou de quitter l'établissement.

Durant l'anesthésie et votre passage en salle de surveillance post-interventionnelle, vous serez pris(e) en charge par un personnel infirmier qualifié, sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur.

QUELS SONT LES RISQUES DE L'ANESTHÉSIE ?

Tout acte médical, même conduit avec compétence et dans le respect des données acquises de la science, comporte un risque.

Les conditions actuelles de surveillance de l'anesthésie et de la période du réveil, permettent de dépister rapidement les anomalies et de les traiter.

Quels sont les inconvénients et les risques de l'anesthésie générale ?

Les nausées et les vomissements au réveil sont devenus moins fréquents avec les nouvelles techniques et les nouveaux médicaments. Les accidents liés au passage de vomissements dans les poumons sont très rares si les consignes de jeûne sont bien respectées.

L'introduction d'un tube dans la trachée (intubation) ou dans la gorge (masque laryngé) pour assurer la respiration pendant l'anesthésie peut provoquer des maux de gorge ou un enrouement passagers.

Des traumatismes dentaires sont également possibles. C'est pourquoi il est important que vous signaliez tout appareil ou toute fragilité dentaire particulière.

Une rougeur douloureuse au niveau de la veine dans laquelle les produits ont été injectés peut s'observer. Elle disparaît en quelques jours.

La position prolongée sur la table d'opération peut entraîner des compressions, notamment de certains nerfs, ce qui peut provoquer un engourdissement ou, exceptionnellement, la paralysie d'un bras ou d'une jambe. Dans la majorité des cas, les choses rentrent dans l'ordre en quelques jours ou quelques semaines.

Des troubles passagers de la mémoire ou une baisse des facultés de concentration peuvent survenir dans les heures suivant l'anesthésie.

Des complications imprévisibles comportant un risque vital comme une allergie grave, un arrêt cardiaque, une asphyxie, sont extrêmement rares. Pour donner un ordre de grandeur, une complication sérieuse ne survient que sur des centaines de milliers d'anesthésies.

Quels sont les inconvénients et les risques de l'anesthésie locorégionale ?

Après une rachianesthésie ou une anesthésie péridurale, des maux de tête peuvent survenir. Ils nécessitent parfois un repos de plusieurs jours ou/et un traitement local spécifique. Une paralysie transitoire de la vessie peut nécessiter la pose temporaire d'une sonde urinaire. Des douleurs au niveau du point de ponction dans le dos sont également possibles. Une répétition de la ponction peut être nécessaire en cas de difficulté. Des démangeaisons passagères peuvent survenir lors de l'utilisation de la morphine ou de ses dérivés. Très rarement, on peut observer une baisse transitoire de l'acuité auditive ou visuelle.

En fonction des médicaments associés, des troubles passagers de la mémoire ou une baisse des facultés de concentration peuvent survenir dans les heures suivant l'anesthésie.

Des complications plus graves comme des convulsions, un arrêt cardiaque, une paralysie permanente ou une perte plus ou moins étendue des sensations sont extrêmement rares. Quelques cas sont décrits, alors que des centaines de milliers d'anesthésies de ce type sont réalisées chaque année.

Au cours de l'anesthésie locorégionale en ophtalmologie, un traumatisme du globe oculaire est exceptionnel.